



Insekt- og fuglevenlige buske – lave arter


Billede	Dansk navn	Latinsk navn / sortsnavn mv.	Godt for
	Benved	<i>Euonymus Alatus</i> 2-4m høj. Har sjove lyserøde frugter og grønliggule blomster i maj. Dybtrødt efterårsløv. Hårdfør og tåler hård beskæring og bruges derfor til udsatte steder. Giftige bær.	Blomster i maj, meget nektarrig og kommer på et tidspunkt med mange sultne insekter. Værtsplante for natsommer-fuglen Benved-måler, og de unge vintergrønne skud er føde for hjortevildt. Den er nem at kende på de firkantede stængler og de rosa frøkapsler, der indeholder gule frø. Frøet er eftertragtet hos fuglene som især drosselfugle er glade for.
	Fjeldribs	<i>Ribes alpinum</i> Højde: 1-1,5m Lille tæt busk, tæt forgrenet. I Danmark er arten vildtvoksende visse steder på Sjælland, Møn og Bornholm. Spiselige bær, men smager ikke godt.	Fjeldribs har lange rakellignende blomsterstande med hver sin lille bitte blomst. Han- og hunblomsterne bæres på forskellige individer (tvebo), hvilket adskiller den fra de andre Ribes-arter. Særligt humlebier er glade for alle ribesarter, da de med deres lange tunger kan nå ind til nektaren. Frugten er ret lille. Busken er en vigtig nektarkilde for insekter og fungerer som værtsplante for mange sommerfuglelarver og andre arter. Bærrene spises gerne af fugle. rødt kortstilket bær, som fugle er vilde med.
	Gedeblad, Dunet	<i>Lonicera Xylosteum.</i> Ca. 2-4m høj	Dunet og Alm. gedeblad er i familie med hinanden, men lidt forskellige.
	Alm. Gedeblad	<i>Lonicera periclymenum</i> Klatrer op til 6 m Begge er hjemmehørende Hårdfør. Tåler skygge. Giftige bær	Alm. gedeblad er en slyngplante, som også kaldes vild kaprifolium, mens dunet gedeblad har et mere busket udseende og klatrer ikke og ad andre træer. Den tidlige blomstring gør den til en vigtig foderplante for tidlige insekter og dekorative men giftige røde bær er fuglene glade for. Den tætte vækst gør samtidig busken særdeles velegnet som skjulested for fugle og mindre dyr.



Billede	Dansk navn	Latinsk navn / sortsnavn mv.	Godt for
	Hassel	<i>Corylus Avellana</i> . 3-5m Mangegrenet, hurtigtvoksende. Hårdfør, men ikke meget tør jord. Tåler skygge. Hjemmehørende Spiselige nødder	Blomster: Hunblomsterne sidder få sammen og er skjult, men de røde grifler rager frem. Hanblomsterne er hængende rakler som ses hele vinteren og leverer pollen til insekter hele vinteren og i det allertidligste forår. Danner tæt løv til skjule- og redesteder. Frø/frugter: Nødderne sidder 2-4 sammen i hver sin has.
	Havtorn	<i>Hippophae Rhamnoides</i> . Også: sandtorn, strandpil, sandtidsel, ørkenbusk, klintepil og klintetidsel 50-300 cm. Tæt busket med torne. Meget hårdfør, tåler vind og mager jord. Danner rodsrud- skal beskæres Hjemmehørende. Spiselige bær	Fuglene ved godt, at bærrerne er sunde og næringsrige, så bærrerne er en yndet ret på menuen. De sidder jo tæt på tornede grene og er derfor meget velegnede til fuglenes vintermad. Danner krat, som giver skjule- og redesteder. Blomstrer med små gule blomster i juni, som insekter holder meget af. Der er han- og hunplanter og en hanplante kan bestøve op til 10 hunplanter.
 	Hunderose	<i>Rosa Canina</i> Højde 1-3m Hårdfør på god jord. Kraftige torne. Kan holde hunde og vildt ude. Rodskyder. Skal beskæres. Aflange hyben med torne på stilken. Hjemmehørende. Spiselige bær.	De åbne, lyserøde eller hvide blomster har let adgang til nektar og pollen, hvilket tiltrækker et bredt udvalg af bier, sommerfugle og andre insekter. Om efteråret udvikler busken røde hyben, som er en kilde til føde for fugle, der spiser frugterne og spreder frøene. Den tætte, tornede vækst giver småfugle et trygt sted at bygge rede og beskytter dem mod rovdyr.
	Hyld	<i>Sambucus Nigra</i> 3-6 m i løvskovene på hele den nordlige halvkugle. Næringsrig jord, skovbryn, tåler nogen salt, frost og vind. Skyggetålende. Sandsynligvis hjemmehørende, dog mener nogle kilder at den er indført med munkene i	Blomsterklaserne giver et rent nektarorgie for insekterne i juni måned. Både store og små insekter lever af hyldens blomster og især de små sorte glimdebøsser kan nærmest invadere blomsterne. Hyldebær ædes af de fleste bærædende fugle; specielt stære sætter pris på frugterne. Bær er traditionelt brugt til hyldebærssaft.

Billede	Dansk navn	Latinsk navn / sortsnavn mv.	Godt for
		1500 tallet. Rå bær giver mavepine.	
 	Klitrose	<i>Rosa pimpinellifolia</i> 50-100 cm høj Nøjsom, trives i barske omgivelser. Danner krat. Mange små torne på stilke Hjemmehørende. Spiselige bær.	Klitrose blomstrer i juni med de smukkeste hvidlige blomster. Især humlebier er glade for klitrosens blomster, da den har et højt indhold af nektar. De blå-sorte hyben er spiselige - også for mennesker og frøene er en glimrende fødekilde for mange fugle. Klitrosens grene danner en kratlignende bevoksning, som er vigtig som skjulested for mange små fuglearter. De kan sidde i store flokke og gemme sig i klitroserne.
	Kristtjørn	<i>Ilex aquifolium</i> Stedsegrøn busk op til 10 m. høj Hjemmehørende Hun og hanplanter. Skyggetålende. Giftig	Bær spises af drosselfugle. Værtsplante for kristtjørnsvikler. Stedsegrønt løv meget vigtigt som skjulesteder og redesteder
	Rød kornel	<i>Cornus sanguinea</i> Op til 3m høj, dog vil årlig nedklipning holde højden på 1-1,5m. Løvfældende med karakteristiske røde grene, som lyser op om vinteren. Rå bær er let giftige. Hjemmehørende	Værtsplante for kornel-plantéhveps. Larverne er små hvide eller gul/sorte og lever i grupper der kan spise mange blade. Derudover kan larver af både Skovblåfugl og Grøn busksommerfugl spise blade af kornel sammen med kristtorn og vedbend. De sorte bær spises af fugle.

Billede	Dansk navn	Latinsk navn / sortsnavn mv.	Godt for
	Skovæble	<i>Malus Sylvestris</i> 3-5m. Ret hårdfør, som helst lidt vindbeskyttet voksested. Spiselig	Skovæblets rosahvide blomster er god insektmad. De små, hvinede sure og matte gule eller grøn-røde æbler bliver hurtigt spist af hjortevildt og fugle. Skud og grene er blandt den mest eftertragtede vinterføde for hjortevildt og harer. Æblerne kan ligge i bunkevis om efteråret til drosselfamiliens vintermenu. Her vil det især være solsorte, men også vintergæsten, sjaggeren, der går efter de nedfaldne æbler.
	Slåen	<i>Prunus Spinosa</i> 3m høj. Busket vækst. Vokser i skovbryn og klitter. Hårdfør, tåler blæst og mager jord. Mange grentorne. Hjemmehørende Ligner mirabelle Sætter rodskud. Skal beskæres Bær spiselige.	Blomstringen sker i april før løvspring, hvor de yndige små hvide blomster sidder tæt på dværgskuddene. Ved blomstringen kan busken minde om et fint hvidt brudeslør, der lyser op i det nøgne forårslandskab. Bær er meget bitre og hårde, men ændrer smag efter at være påvirket af frost, hvorefter frugten er meget efterstræbt af fugle. Værtsplante for guldhale og sortåret hvidvinge.
	Surbær / Aronia	<i>Melanocarpa</i> Højde 1-2 m busket vækst. Trives i mange jordtyper. Hårdfør og ikke plejekrævende. Kan skæres ned efter behov. Oprindelse: Nordamerika Spiselig	Aronia blomstrer i maj-juni og er derfor en vigtig madkilde til tidlige insekter. Bærrene modner i september og er vigtig vintermad for mange fuglearter. Spiselige bær med højt indhold af antioxidanter. Gælder som superfood. Danner meget smukt rødt efterårsløv.
	Tjørn. Engriflet Alm. Tjørn	<i>Crataegus Monogyna</i> <i>Crataegus laevigata</i> Højde: 2-4 m. Træet tåler både kraftig vind, frost og tør jord Hjemmehørende Spiselige bær, blomster og blade	De hvide blomster giver masser af nektar til bier og andre insekter om foråret. Der findes en lang række mindre insekter som snudebiller og tjørnebladsbiller der er fødegrundlag for de mindre insektædende fugle som mejserne. Mad til fugle: Fuglene spiser de små røde bær om efteråret og vinteren og bruger busken som skjulested.

Billede	Dansk navn	Latinsk navn / sortsnavn mv.	Godt for
	Tørst	<i>Rhamnus Frangula</i> 2 m lille løvfældende busk. Hjemmehørende. Trives i sol eller skygge og vokser i almindelig jord. Nøjsom. Undgå vejsalt og kraftig vind.	Yderst bi-/insektvenlige, værtsplante for citronsommerfugl og skovblåfugl, stabil nektar-værdi. Blomstrer i maj/juni med små hvidgrønne blomster med lang blomstringstid. Grønne bær der først bliver røde, senere sorte. God til fuglene men giftige for os.
	Vrietorn	<i>Rhamnus cathartica</i> Op til 6 m Skovbryns-plante. Tvekønnet(han og hunplanter). Lyskrævende, hårdfør. Hjemmehørende Hele planten er giftig.	Vrietorn er særlig vigtig til dagsommerfugle/natsommerfugle som Citronsommerfugl, Grøn Busksommerfugl og Skovblåfugl som er afhængige af den som værtsplante til deres æg, planten bliver til en stor busk/lille træ. Stenfrugter spises af fugle. Kraftige torne giver gode skjule- og redesteder.
 	Æble Rose	<i>Rosa rubiginosa</i> Højde 1-2m Hårdfør på god jord. Ynder lidt vindbeskyttet voksested. Rodskyder. Skal beskæres. Aflange hyben med torne på stilken. Spiselige bær Hjemmehørende	Æblerose blomstrer i juni med de smukkeste rosa blomster blomster der har en stærk rosen/æbleduft. Den tiltrækker mange insekter, der på varme dage besøger blomsterne i store mængder, da den har et højt indehold af nektar. De røde hyben er aflange og kan anvendes til marmelade og snaps. Frøene er en glimrende fødekilde for mange fugle. Den giver skjulesteder for mange små fuglearter. De kan sidde i store flokke og gemme sig i buskadset.