

GODT RÅD TIL LUGNINGEN:

Når jorden er fugtig (f.eks. efter en regnbyge) er det meget lettere at få hele roden med op. Især tidsler kan skyde igen fra selv et lille stykke rod, der bliver siddende i jorden.

Pletvis såning: I stedet for at sprede frø over det hele, kan du lave små "øer", hvor du fjerner alt græs og blotlægger jorden helt.

Bland med sand: Bland de små frø med lidt fugtigt sand. Det gør det meget lettere at fordele dem jævnt, og du kan se, hvor du har sået.

TIP TIL BIODIVERSITETEN

Lad en lille "ø" af din eng stå uslået vinteren over. De visne stængler fungerer som vinterhi for insekter og deres æg. Til foråret kan du så slå denne ø.

Hævet sandbed: Når bedet hæves op over terrænet bliver det ekstra tørt og varmt. De nøjsomme vilde blomster klarer sig godt her, hvor aggressive græsser og andre konkurrencearter har det svært. Samtidig er det hævede bed et værdifuldt levested for jordboende bier, varmekrævende insekter og vekselvarme dyr. F.eks. blå slangehoved, hvid okseøje, alm. syre, kongepen, kællingetand, kornvalmue og dueskabiose.

MAD TIL INSEKTERNE

De gule kurvblomster - især mælkebøtten kommer lige på det tidspunkt, hvor mange insekter som humlebieerne vågner af vinterdvalen og er meget sultne.

Andre som kongepen, høstborst og høgeurt-arter kommer lidt senere og lyser op med deres små fine gule hoveder og pynter i blomsterengen – **helt gratis!**



SÅDAN FÅR DU EN SMUK BLOMSTERENG



Foreningen for borgernær biodiversitet

HOLD DIN BLOMSTERENG SMUK OG ARTSRIG

En blomstereng er altid smukkest de første år efter den er anlagt. Her skal blomsterne ikke konkurrere med græs og andre planter, som hurtigt kommer til som f.eks. tidsler, bynke og nælder. Disse er pionerplanter, som er der lige så snart, der er en bar plet jord.



HVAD SKAL LUGES UD?

Selvom alt er natur, er nogle planter så aggressive, at de kan udkonkurrere de mere sarte blomster, hvis de får lov at sprede sig frit.

Ager-Tidsel - spreder sig aggressivt med både frø og dybe rødder. De bør trækkes op med rod (husk handsker!) eller klippes ned, før de danner de dunede frøhoveder, der flyver med vinden.

Grå-Bynke - bliver hurtigt meget høj og busket. Selvom den er god for nogle insekter, skygger den de lavere blomster væk.

Stor Brændenælde - trives, hvor der er meget næring (kvælstof) i jorden. Hvis de tager over, er det et tegn på, at du skal være endnu grundigere med at fjerne afklippet græs fra din eng. Fjern dem med rod for at give plads til de nøjsomme blomster.

Brombær - er fantastiske i et hegn, men i en blomstereng sender de lange "arme" ud, som slår rod, hver gang de rører jorden. De kan hurtigt forvandle din eng til et uigennemtrængeligt krat.



VEDLIGEHOLDESE AF DIN BLOMSTERENG

Slåning (Høst): Slå engen - gerne med le!

Formålet er at fjerne næring fra jorden, da vilde blomster trives bedst i udpint jord, hvor græsset ikke kan udkonkurrere dem.

Gør det i sensommeren eller tidlig efterår, hvor de fleste planter har smidt sine frø.

Lad det ligge

Når du har slået, skal du lade det afskårne materiale ligge i 2-4 dage. Dette giver frøene mulighed for at tørre og falde ned i jorden, så de kan spire næste år.

Fjern afklippet

Efter et par dage skal du fjerne alt det afklippede materiale, så det ikke ligger og nedebyrdes og bliver til gødning. For meget næring gør jorden for fed giver grobund for grove græsser og brændenælder.

Den nemmeste del - Gør ingenting

Jo mindre næring der er i jorden, jo flere forskellige blomsterarter vil du få over tid.

EFTERSÅNING TIL EFTERÅRET

Hvis din eng har bare pletter, eller hvis du vil have mere farve næste år, er sep-okt et godt tidspunkt at efterså.

Skrab i jorden med en rive for at lave "sår" i jordbunden. Træd frøene ned så de får jordkontakt og kan spire.

Så hjemmehørende flerårige arter, som passer til vores fauna:
Aftenstjerne, Bakkenellike, Blåhat, Forglemmigej, Hjortetrøst, Judaspenge, Knopurt, Kongelys, Katost, Katteurt, Natviol, Okseøje, Ranunkel, Storkenæb, Trævlekrone, Valmue...

