

BLÅHAT



Blåhat, *Knautia arvensis* er flerårig og er en almindelig vild plante på nærings-fattige og solåbne steder, og vokser naturligt på enge, overdrev og grøftkanter over det meste af landet.

Den bliver 30-75 cm høj, og blomsterne sidder på stængler med 34 dejlige blåviolette blomster, som er en fantastisk nektarkilde for mange forskellige bier og sommerfugle. Hvis man vil hjælpe bestøverne i haven, så er blåhat altså et godt valg, og den flotte plante kan også sagtens gøre sig godt i en mere plejet (ikke-vild) have!

Blomstrer i juni-august og sætter frø i juli-sep. Blomsten sidder i en lille kurv og frøet indeholder en lille smule fedt. Det er myrerne vilde med, som fragter frøet rundt og




hjælper planten med at få frøet spredt.

Blåhat og insekterne

Blåhat er en god nektarplante, som besøges af mange forskellige insekter.

Den er dog værtsplante for to specialister, blåhatjordbi og blåhathvepsebi. Blåhathvepsebi er meget sjælden og er en snylter der lever af blåhatjordbien. Blåhatjordbien er lidt større end en honningbi og lever kun af blåhat planten. Den tilhører familien gravebier og graver redegange i jordbunden. Bien og dens larve lever kun af nektar og den blå pollen fra blåhat eller andre planter i kartebollefamilien som dueskabiosa eller djævelsbid eller kartebolle. Også sommerfugle som blåfuglen ynder blåhat.



Sådan dyrker du blåhat:

Det bedste såtidspunkt for blåhat er efterår, da frøene skal have en periode med påvirkning af kulde og fugt for at spire optimalt, men det kan dog lykkes at få den til at spire om foråret. Når frøet er spiret, dannes en lille bladroset, med 4-6 små stærkt behårede blade. Når bladrosetten er blevet 7-10 cm stor, kommer de typiske 'voksne' blade, som er fjersnitdelte med en spids.

Sådan kuldespirer du: bland frøet med fugtig mager jord og læg blandingen i en pose eller bøtte. Sæt den i køleskabet 2-3 uger. Så frøet efterfølgende. Så får du en bedre og mere ensartet spiring.